

Sigue sintiendo **la urgencia de orinar**, incluso después del tratamiento para la BPH (hiperplasia prostática benigna)? Puede deberse a la vejiga hiperactiva (OAB).

CONOZCA CÓMO GEMTESA PUEDE AYUDARLE A COMBATIR LOS 3 SÍNTOMAS PRINCIPALES* DE LA OAB



HAGA DE GEMTESA SU ALIADO PARA ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DE LA OAB

*Urgencia, frecuencia y episodios de pérdida.

¿QUÉ ES GEMTESA?

GEMTESA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar los siguientes síntomas debido a una afección llamada vejiga hiperactiva (overactive bladder, OAB) en adultos y en hombres adultos que toman medicamentos para la hiperplasia prostática benigna (benign prostatic hyperplasia, BPH): episodios de pérdida, urgencia y frecuencia.

Se desconoce si GEMTESA es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome GEMTESA si es alérgico al vibegrón o a alguno de los componentes de GEMTESA.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y la Información para el paciente sobre GEMTESA [aquí](#).

GEMTESA®
(vibegron) 75 mg tablets

LA OAB ES MÁS FRECUENTE DE LO QUE CREE: NO ESTÁ SOLO

Aproximadamente

1 de cada 10

estadounidenses se ven afectados por los síntomas molestos de la OAB.

ESO SIGNIFICA QUE SON 33 MILLONES DE PERSONAS APROXIMADAMENTE.

La OAB es una afección crónica, y los síntomas de urgencia, frecuencia y pérdida pueden empeorar con el tiempo si no se tratan. Si bien la OAB no se puede curar, se puede controlar.

LO QUE **ES** LA OAB

Debe preguntarle a su médico sobre la OAB si experimenta uno o más de estos síntomas:



Sentir una repentina necesidad de orinar inmediatamente



Orinar más de 8 veces al día



A menudo, tiene problemas para "aguantarse" o tiene incontinencia antes de llegar al baño

LO QUE **NO** ES LA OAB

- ✗ Algo con lo que siempre debe lidiar por su cuenta
- ✗ Una afección que siempre requiere cirugía para su tratamiento
- ✗ Siempre tratable solo mediante cambios en el estilo de vida
- ✗ Algo con lo que solo luchan las mujeres
- ✗ Solo una parte normal del envejecimiento

LA OAB ES FRECUENTE EN HOMBRES. HABLAR SOBRE ELLO NO LO ES

Muchos hombres suelen pasar por alto los síntomas de la OAB con la esperanza de que desaparezcan por sí solos.


Hasta un

75%




de los hombres con BPH (una próstata agrandada no cancerosa) también tienen síntomas de OAB, pero estos síntomas a veces se pasan por alto porque podrían ser similares a los de la BPH.

¿Cuál es la diferencia entre la OAB y la BPH?



En la OAB, las señales nerviosas le indican a la vejiga que se vacíe incluso cuando no está llena, lo que provoca esa sensación de "no poder aguantar"



En la BPH, el agrandamiento de la próstata ejerce presión sobre la uretra, lo que provoca una sensación de "tengo que orinar, pero no puedo", que se traduce en un simple goteo

Es importante que pida a su médico que compruebe para ambas enfermedades, ya que se utilizan distintos medicamentos para cada una de ellas.

CONOZCA LA DIFERENCIA




LA OAB PUEDE SENTIRSE COMO UNA VÁLVULA DE AGUA QUE SE ABRE INESPERADAMENTE

TANTO LA OAB COMO LA BPH PUEDEN CAUSAR

LA BPH PUEDE SENTIRSE COMO UNA TUBERÍA PARCIALMENTE OBSTRUIDA QUE GOTEA AGUA

Esta no es una lista completa de todos los síntomas de la OAB y la BPH. GEMTESA está indicado para tratar los 3 síntomas clave de la OAB (episodios de pérdida, urgencia y frecuencia). La OAB y la BPH son afecciones diferentes y se tratan con diferentes medicamentos.



Los síntomas de la OAB que persisten a pesar del tratamiento activo de la BPH pueden indicar un problema en la vejiga además de la próstata.

LIMITARSE A LIDIAR CON LOS SÍNTOMAS NO TRATADOS DE LA OAB PUEDE AFECTAR MÁS QUE SOLO A SU VEJIGA



Vivir con OAB sin tratar puede significar tener que adaptar su estilo de vida para lidiar con los síntomas de urgencia, frecuencia y episodios de pérdida.

Estas son solo algunas formas en que los hombres que viven con OAB sin controlar pueden adaptar sus estilos de vida para enfrentar sus síntomas:

Cambiar la dieta:
reducir ciertos
alimentos/bebidas

Usar
productos
absorbentes

Trazar un
mapa de
los baños
disponibles

Llevar recipientes
vacíos en momentos
en los que no pueden
encontrar un baño
rápidamente

Vaciar la vejiga
varias veces en un
período breve

Llevar ropa
extra en
caso de
emergencia

Limitar la
ingesta de
líquidos

Planificar viajes
en torno a la
disponibilidad
de baños

Tratar solo la BPH puede no ser suficiente

Su médico puede ofrecerle un medicamento dirigido específicamente a la vejiga junto con el tratamiento de la BPH. Existen 2 tipos principales de tratamientos recetados disponibles para tratar los síntomas de la OAB:

- **Los agonistas beta₃ (agonistas β₃)** actúan para reducir los síntomas de la OAB al ayudar que el músculo de la vejiga se relaje para que contenga más orina
- **Los anticolinérgicos (anticholinergics, ACH)** actúan para disminuir los síntomas de la OAB al ayudar a detener las contracciones involuntarias de la vejiga (la vejiga se contrae sin su control)



**¿Por qué aguantar más de lo necesario?
Hay una opción de tratamiento para
la OAB que puede ayudar.**

GEMTESA PUEDE AYUDARLE A ALIVIAR LOS SÍNTOMAS DE LA OAB

DOSIS CONVENIENTES

Un tratamiento una vez al día para la OAB en hombres que reciben tratamiento para la BPH



RESULTADOS

GEMTESA está aprobado por la FDA para tratar la OAB en hombres que reciben tratamiento para la BPH que experimentan:



- ganas inusualmente intensas de orinar
- micción frecuente (8 o más veces al día)
- sensación urgente de orinar que puede derivar en episodios de incontinencia

PERFIL DE SEGURIDAD

Sin consecuencias significativas en la PA (presión arterial)



- Sin cambios clínicamente significativos en la hipertensión ni aumento de la presión arterial en comparación con el placebo*

*En un estudio clínico de hombres y mujeres, las personas que tomaron GEMTESA y las que tomaron placebo tuvieron tasas similares de hipertensión (1.7% [9 de 545 personas] frente al 1.7% [9 de 540 personas], respectivamente) y aumento de la presión arterial (0.7% [4 de 545 personas] frente al 0.9% [5 de 540 personas], respectivamente).

En un estudio de OAB en hombres tratados por hiperplasia prostática benigna (BPH), las tasas de hipertensión fueron del 9.0% con GEMTESA (50 de 553 personas) frente a 8.3% con placebo (46 de 551 personas).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

Antes de tomar GEMTESA, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, lo que incluye si tiene problemas hepáticos, problemas renales, problemas para vaciar

8



Hable con su médico sobre GEMTESA — un tratamiento aprobado por la FDA para tratar los síntomas de la OAB que puede tomar con su medicamento para la BPH

la vejiga o un flujo de orina débil; si toma medicamentos que contienen digoxina; si está embarazada o planea quedar embarazada (no se sabe si GEMTESA le causará daño a su bebé en gestación; hable con su médico si está embarazada o planea quedar embarazada); si está amamantando o planea amamantar (no se sabe si GEMTESA pasa a su leche materna; hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma GEMTESA).

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y la Información para el paciente sobre GEMTESA [aquí](#).


GEMTESA®
(vibegron) 75 mg tablets

SE HA DEMOSTRADO QUE GEMTESA AYUDA A REDUCIR LOS SÍNTOMAS DE LA OAB (PÉRDIDA, URGENCIA Y FRECUENCIA) EN HOMBRES QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA LA BPH

En un ensayo clínico, la mayoría de los hombres con BPH que tomaban GEMTESA experimentaron una reducción significativa de todos los síntomas de la OAB a las 12 semanas de uso constante según lo recetado.

.....A LAS 12 SEMANAS.....

Permanecer en movimiento, con menos urgencia de orinar



Los hombres con BPH que tomaron GEMTESA tuvieron casi 3 (-2.88) visitas menos al baño con sentimientos de "necesidad urgente de ir al baño" en promedio en comparación con unas 2 visitas menos (-1.93) para quienes tomaron el placebo*.

Menos visitas al baño significan menos interrupciones diarias



Los hombres con BPH que tomaron GEMTESA tuvieron unas 2 (-2.04) visitas menos al baño al día en promedio en comparación con 1 (-1.3) visita menos al día para quienes tomaron el placebo*.

Un tratamiento para la OAB que puede ayudar a aliviar esa sensación de "no poder aguantarse"



Los hombres con BPH que tomaron GEMTESA tuvieron unos 2 (-2.19) episodios de pérdida menos al día en comparación con aproximadamente 1 (-1.39) episodio menos para quienes tomaron placebo†.

*Un total de 146 personas recibieron GEMTESA y 151 personas recibieron el placebo.

†Un total de 538 personas recibieron GEMTESA y 542 personas recibieron el placebo.

Los hombres que tomaron GEMTESA tenían que ir con menos frecuencia, tenían menos visitas al baño "con urgencia" y menos episodios de pérdida



Se ha comprobado que GEMTESA trata los 3 síntomas clave de la OAB (urgencia, frecuencia y episodios de pérdida) en hombres que toman medicamentos para la BPH.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos herbarios. Conozca los medicamentos que toma. Conserva una lista de ellos para mostrar a su médico y a su farmacéutico cuándo recibe un nuevo medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GEMTESA?

GEMTESA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

• incapacidad de vaciar la vejiga (retención urinaria).

GEMTESA puede aumentar sus probabilidades de no poder vaciar la vejiga, especialmente si tiene obstrucción de la salida de la vejiga o toma otros medicamentos para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Informe a su médico de inmediato si no puede vaciar la vejiga.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y la Información para el paciente sobre GEMTESA [aquí](#).



GEMTESA TIENE UN PERFIL DE SEGURIDAD COMPROBADO EN HOMBRES CON OAB QUE RECIBEN TRATAMIENTO PARA LA BPH



Hay algunas cosas importantes que debe saber sobre GEMTESA

En un ensayo clínico*:

- Menos del 3% de las personas dejó de tomar GEMTESA debido a los efectos secundarios
- La hipertensión se produjo en el 9.0% de los pacientes que tomaban GEMTESA (50 de 553 personas) en comparación con el 8.3% de los que tomaban placebo (46 de 551 personas)
- La infección de las vías urinarias se produjo en el 2.5% de las personas que tomaban GEMTESA (14 de 553 personas) en comparación con el 2.2% de las personas que tomaban placebo (12 de 551 personas)

*La seguridad de GEMTESA se estudió en un ensayo de 24 semanas en pacientes varones con OAB que recibían tratamiento para la BPH.



Los efectos secundarios más frecuentes de GEMTESA en ensayos clínicos fueron dolor de cabeza, infección de las vías urinarias, congestión nasal, dolor de garganta o goteo nasal, diarrea, náuseas e infección respiratoria de vías superiores.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GEMTESA? (CONTINUACIÓN)

- angioedema.** GEMTESA puede causar una reacción alérgica con hinchazón de los labios, la cara, la lengua o la garganta, con o sin dificultad para respirar y puede ser potencialmente mortal. Deje de usar GEMTESA y busque ayuda médica de emergencia de inmediato si tiene síntomas de angioedema o dificultad para respirar.

No debe preocuparse de que GEMTESA interfiera con su medicamento para la BPH: pueden tomar ambos al mismo tiempo sin que los fármacos interactúen.



Informe a su médico sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos herbarios, o si toma medicamentos que contengan digoxina.



Los comprimidos que se muestran no son de tamaño real y son solo para fines ilustrativos. La imagen no representa el régimen de un solo paciente.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y la Información para el paciente sobre GEMTESA [aquí](#).


GEMTESA®
(vibegron) 75 mg tablets

>97%

Según un ensayo de 24 semanas, más del 97% de las personas que tomaron GEMTESA pudieron continuar con el tratamiento con efectos secundarios manejables o sin efectos secundarios



GEMTESA tiene un perfil de seguridad comprobado a las 24 semanas de uso regular en hombres que toman medicamentos para la BPH



52 SEMANAS

En un estudio clínico, se demostró la seguridad y eficacia durante un máximo de 52 semanas en personas con síntomas de OAB

Una vez que comienza a ver los resultados con GEMTESA, es importante continuar tomando su medicamento todos los días para controlar los síntomas de la OAB.

RECUERDE: La OAB es una enfermedad crónica y no desaparece, pero puede controlarse mientras tenga un plan de tratamiento.

Para obtener resultados a largo plazo, siga adelante. Puede ser tentador dejar de tomar GEMTESA si sus síntomas mejoran, pero hable con su médico antes de realizar cualquier cambio en su plan de tratamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

Los efectos secundarios más frecuentes de GEMTESA incluyen dolor de cabeza, infección de las vías urinarias, congestión nasal, dolor de garganta o goteo nasal, diarrea, náuseas e infección respiratoria de las vías superiores. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de GEMTESA. Para obtener más información, consulte a su médico o su farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento relacionado con su salud sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

¡HABLE POR USTED MISMO Y SU VEJIGA!

Si experimenta síntomas de OAB, puede ser momento de recibir tratamiento. Use estas preguntas para comenzar la conversación con su médico y averiguar si GEMTESA es adecuado para usted:



¿Funcionará bien GEMTESA con otros medicamentos que estoy tomando?



¿Se ha demostrado que GEMTESA reduce la urgencia?



¿En qué se diferencia GEMTESA de otros tratamientos para la OAB?



¿Con qué frecuencia debo tomar GEMTESA?



¿Qué efectos secundarios puedo esperar?



¿Cuándo puedo comenzar a ver los resultados después de empezar con GEMTESA?

TIME TO GO™

Vea cómo las personas reales que tomaron GEMTESA pasaron de lidiar con la OAB a controlarla



Visite TimeToGo.com

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y la Información para el paciente sobre GEMTESA aquí.



GEMTESA®
(vibegron) 75 mg tablets

EL CAMINO HACIA EL ALIVIO PUEDE SER MÁS SENCILLO CON GEMTESA PATIENT SUPPORT (GPS)

Si ya ha recibido una receta o una muestra de GEMTESA de su médico, visite StartGEMTESA.com para obtener estos recursos y más para comenzar:

 APOYO AL
PACIENTE
CON GEMTESA



- Información sobre cobertura y posibles ahorros
- Recursos para ayudarle a hablar con su médico, seguir el tratamiento y prepararse para su cita de seguimiento
- Recordatorios de reposición
- Historias reales de otras personas que viven con OAB
- Apoyo en vivo a través del centro de atención telefónica

Obtenga más
información sobre los
posibles ahorros y apoyo



INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO

¿Qué es GEMTESA?

GEMTESA es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar los siguientes síntomas debido a una afección llamada vejiga hiperactiva (overactive bladder, OAB) en adultos y en hombres adultos que toman medicamentos para la hiperplasia prostática benigna (benign prostatic hyperplasia, BPH): episodios de pérdida, urgencia y frecuencia.

Se desconoce si GEMTESA es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome GEMTESA si es alérgico al vibegrón o a alguno de los componentes de GEMTESA.

Antes de tomar GEMTESA, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, lo que incluye si tiene problemas hepáticos, problemas renales, problemas para vaciar la vejiga o un flujo de orina débil; si toma medicamentos que contienen digoxina; si está embarazada o planea quedar embarazada (no se sabe si GEMTESA le causará daño a su bebé en gestación; hable con su médico si está embarazada o planea quedar embarazada); si está amamantando o planea amamantar (no se sabe si GEMTESA pasa a su leche materna; hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si toma GEMTESA).

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos herbarios. Conozca los medicamentos que toma. Consérve una lista de ellos para mostrar a su médico y a su farmacéutico cuándo recibe un nuevo medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GEMTESA?

GEMTESA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **incapacidad de vaciar la vejiga (retención urinaria).** GEMTESA puede aumentar sus probabilidades de no poder vaciar la vejiga, especialmente si tiene obstrucción de la salida de la vejiga o toma otros medicamentos para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Informe a su médico de inmediato si no puede vaciar la vejiga.
- **angioedema.** GEMTESA puede causar una reacción alérgica con hinchazón de los labios, la cara, la lengua o la garganta, con o sin dificultad para respirar y puede ser potencialmente mortal. Deje de usar GEMTESA y busque ayuda médica de emergencia de inmediato si tiene síntomas de angioedema o dificultad para respirar.

Los efectos secundarios más frecuentes de GEMTESA incluyen dolor de cabeza, infección de las vías urinarias, congestión nasal, dolor de garganta o goteo nasal, diarrea, náuseas e infección respiratoria de las vías superiores. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de GEMTESA. Para obtener más información, consulte a su médico o su farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento relacionado con su salud sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información para el paciente sobre GEMTESA [aquí](#).

DESCUBRA AHORROS Y ASISTENCIA PARA PACIENTES CON SEGURO COMERCIAL, ES POSIBLE QUE PAGUE TAN SOLO



CADA VEZ QUE RELLENE SU
SUMINISTRO DE

90 DÍAS SI*:

- Tiene seguro comercial
- GEMTESA está cubierto por su plan

OFERTA
POR TIEMPO
LIMITADO

O
BIEN

PUEDE PAGAR TAN SOLO \$10
POR CADA SUMINISTRO DE 30 DÍAS*

Si tiene seguro comercial (los planes gubernamentales como Medicare o Medicaid no son elegibles) y GEMTESA no está cubierto por su plan; **puede pagar tan solo \$95*** por cada suministro de 30 días.

Para preguntas sobre este programa, llame al: **1-833-876-8268**.

Visite [GEMTESA.com/save](#) para saber si es elegible.

*Se aplican restricciones y límites máximos de ahorro. La cobertura y los costos de bolsillo pueden variar. La oferta no es válida para pacientes que participan en Medicare, Medicaid u otros programas gubernamentales de salud. Consulte los términos, las condiciones y los criterios de elegibilidad completos del programa en [GEMTESA.com/card](#).



Use su método preferido para inscribirse hoy mismo:

Envíe un mensaje de texto con
"GEMTESA" al **436872**

O
BIEN

Visite
[GEMTESA.com/card](#)

Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. Hasta 15 mensajes al mes después de las comunicaciones de inscripción iniciales. Envíe un mensaje de texto con "STOP" para cancelar la suscripción en cualquier momento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

No tome GEMTESA si es alérgico al vibegrón o a alguno de los componentes de GEMTESA.

Consulte la Información de seguridad importante adentro y la Información para el paciente sobre GEMTESA [aquí](#).

Sumitomo Pharma

◆ es una marca comercial de Sumitomo Pharma Co., Ltd., utilizada bajo licencia. SUMITOMO PHARMA es una marca comercial de Sumitomo Pharma Co., Ltd., utilizada bajo licencia. SUMITOMO es una marca comercial de Sumitomo Chemical Co., Ltd., utilizada bajo licencia. Sumitomo Pharma America, Inc. es una filial estadounidense de Sumitomo Pharma Co., Ltd.

GEMTESA y el logotipo de GEMTESA son marcas comerciales de de Sumitomo Pharma Co., Ltd., utilizadas bajo licencia.

©2025 Sumitomo Pharma America, Inc.
Todos los derechos reservados.
GEM-US-0299-25 10/25



GEMTESA®
(vibegron) 75 mg
tablets



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este es un resumen de la información sobre GEMTESA. Esto no sustituye la conversación con su médico sobre su afección o tratamiento médico.

¿Qué es GEMTESA?

GEMTESA es un medicamento de venta con receta que se puede usar para tratar los siguientes síntomas de vejiga hiperactiva en adultos y en hombres adultos que toman medicamentos para la hiperplasia prostática benigna (benign prostatic hyperplasia, BPH):

- **Incontinencia urinaria de urgencia:** necesidad importante de orinar acompañada de pérdidas o accidentes en los que la persona se moja
- **Urgencia:** la necesidad de orinar de inmediato
- **Frecuencia:** orinar a menudo

Se desconoce si GEMTESA es seguro y eficaz en niños

¿Quién no debe tomar GEMTESA?

- **No tome GEMTESA si es alérgico al vibegrón o a alguno de los componentes de GEMTESA.**
 - **Principio activo:** vibegrón
 - **Componentes inactivos:** croscarmelosa sódica, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, manitol y celulosa microcristalina. El recubrimiento de película verde claro contiene FD&C azul n.º 2: laca de aluminio, hipromelosa, óxido de hierro amarillo, monohidrato de lactosa, dióxido de titanio y triacetina

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar GEMTESA?

Antes de tomar GEMTESA, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- tiene problemas hepáticos
- tiene problemas renales
- tiene problemas para vaciar la vejiga o tiene un flujo de orina débil
- toma medicamentos que contengan digoxina
- está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si GEMTESA le causará daño a su bebé en gestación. Hable con su médico si está embarazada o planea quedar embarazada
- está amamantando o planea amamantar. No se sabe si GEMTESA pasa a su leche materna. Hable con su médico sobre la mejor forma de alimentar a su bebé si toma GEMTESA

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de GEMTESA?

GEMTESA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

- **Incapacidad de vaciar la vejiga (retención urinaria).** GEMTESA puede aumentar sus probabilidades de no poder vaciar la vejiga, especialmente si tiene obstrucción de la salida de la vejiga o toma otros medicamentos para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Informe a su médico de inmediato si no puede vaciar la vejiga
- **Angioedema.** GEMTESA puede causar una reacción alérgica con hinchazón de los labios, la cara, la lengua o la garganta, con o sin dificultad para respirar y puede ser potencialmente mortal. Deje de usar GEMTESA y busque ayuda médica de emergencia de inmediato si tiene síntomas de angioedema o dificultad para respirar

Los efectos secundarios más frecuentes de GEMTESA incluyen:

- Dolor de cabeza
- Infección de las vías urinarias
- Congestión nasal, dolor de garganta o goteo nasal
- Diarrea
- Náuseas
- Infección respiratoria de las vías superiores



Estos no son todos los posibles efectos secundarios de GEMTESA. Para obtener más información, consulte a su médico o su farmacéutico. **Llame a su médico para obtener asesoramiento relacionado con su salud sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.**

¿Hay alguna otra información importante que debería conocer?

- Este es solo un resumen de la información importante sobre GEMTESA. Para saber más, hable con su proveedor de atención médica o su farmacéutico
- El etiquetado del producto aprobado por la FDA se puede encontrar en GEMTESA.com
- También puede notificar los efectos secundarios a la FDA en el 1-800-FDA-1088

◆ es una marca comercial de Sumitomo Pharma Co., Ltd., utilizada bajo licencia. SUMITOMO PHARMA es una marca comercial de Sumitomo Pharma Co., Ltd., utilizada bajo licencia. SUMITOMO es una marca comercial de Sumitomo Chemical Co., Ltd., utilizada bajo licencia. Sumitomo Pharma America, Inc. es una filial estadounidense de Sumitomo Pharma Co., Ltd.

GEMTESA y su logotipo son marcas comerciales registradas de Sumitomo Pharma Co., utilizadas bajo licencia.

©2025 Sumitomo Pharma America, Inc. Todos los derechos reservados.
GEM-US-0390-25 09/25



Informe a su médico sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con y sin receta, las vitaminas y los suplementos herbarios.

Sumitomo Pharma